



## CRITERIS DE NO-ASSISTÈNCIA DE L'ALUMNAT A L'ESCOLA DE FORMA DETERMINADA A CAUSA DE MALALTIES TRANSMISSIBLES



PROCÈS	EXCLUSIÓ	COMENTARIS
Malalties gastrointestinals. (diarrees /vòmits)	Fins a 48h després que les deposicions s'hagin normalitzat. En el cas de la Salmonel·la, pot ser necessari mostres de la femta.	Com a mesures especials en aquestos casos s'han de rentar les mans dels nens i adults
Varicel·la	Des de 1 o 2 dies abans de la erupció fins 6 dies després que hagi aparegut l'exantema, o fins que les lesions s'han assecat i han fet crosta	
Rubèola	Fins a 7 dies després que hagi aparegut la erupció	
Xarampió	Des de 1 o 2 dies abans del començament dels símptomes (3-5 dies abans de l'inici de l'erupció) fins 7 dies després que hagi aparegut l'exantema.	Cal excloure tots els nens susceptibles de tenir la malaltia no vacunats (es vacunen als 12 mesos i als 3 anys) si no estan vacunats s'han d'excloure fins a 21 dies després de l'inici de l'exantema
Impetigen contagiós	Fins a 24 hores després que el nen/a hagi iniciat el tractament	Infecció bacteriana de la pell, que origina una lesió costrosa, groguenca.
Mol·lusc contagiós o berrugues	No cal excloure al menor de l'escola	Excloure que facin pràctiques esportives que impliqui un contacte cutani estret (lluïta lliure o similars) o compartir tovalloles.
Polls	Fins a 24 hores després que el nen hagi iniciat el tractament	
Tuberculosi	La majoria de nens amb Tuberculosi no contagien, però per a prevenir possible esput positiu es recomana fins a 5-7 dies després d'iniciat el tractament antibiòtic	
Conjuntivitis	Fins a 24 hores després que el nen hagi iniciat el tractament ( en cas de no tenir febre)	
Infecció pel virus de l'Hepatitis A	Fins a 7 dies després que hagi aparegut els símptomes de la icterícia. Aquest virus s'elimina per la femta.	Transmissió feco-oral. S'elimina per la femta des de 2 setmanes abans de l'aparició de la icterícia fins a 1 després. Si es troba un cas de malaltia, s'ha de vacunar als seus companys tan aviat com sigui possible
Infecció pel virus de l'Hepatitis B	No és precisa l'exclusió perquè els nens tenen aquesta vacuna en el seu calendari vacunal infantil.	Si un nen amb infecció crònica per hepatitis B, mossega a un altre, suposa un risc addicional i és aconsellable valoració individual.

Meningitis	pot reiniciar l'activitat escolar quan rebi l'alta hospitalària o recuperació total del nen/a	Segons el tipus de germen, les autoritats sanitàries donaran les mides adients per als NO contactes.
Galteres	Exclusió escolar de 5 a 9 dies després del diagnòstic	
VIH	Cal permetre l'escolarització sempre i quan l'estat immunitari ho permeti (estat no detectable)	No s'adquireix mitjançant llàgrimes, saliva, contacte, suor, tos, esternuts...etc. S'ha de tenir mesures per manipular vessaments de sang o ferides
Grip	Fins a no tenir febre o la seva millora general	els nens/es amb patologia crònica han de rebre la vacuna anualment.
Sarna	Fins que el nen/a acabi el tractament sencer.	La picor pot persistir setmanes. Rascar-se les lesions pot afavorir el contagi pell amb pell
Tinya	No és precisa l'exclusió a l'escola. Si hi haurà exclusió a piscines!	Es transmet d'animals a persones però generalment no entre persones.

**Aquesta documentació ha estat estreta:**

Departament de Pediatria del Institut universitari Dexeus

Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria Al cuidado de la infancia y la adolescencia

