


RESULTATS (II)


QUALITAT DE LA LECTURA

DISTÀNCIA: 49 cm


QUALITAT DE LA LECTURA COMPARADA ENTRE L'ANGLE DE LECTURA ($^{\circ}$) I EL TEMPS DE RECONeixEMENT (s)



QUALITAT DE LA LECTURA RELACIÓ ENTRE TEMPS DE RECONeixEMENT I ANGLE DE LECTURA



Per quadrants l'evolució és semblant tot i que el superior tant el temps de reconeixement com l'angle són menors.




A mesura que ens allunyem de la perpendicularitat (angle) el temps es cada vegada és més dispers.


Figs. 9 - 10. Resultats poblacionals referents al segon estudi, la qualitat de la lectura.

VISIÓ ESTEREOSCÒPICA (I) - LLINDAR D'ESTERÒPSIA

VALORS DEL LLINDAR D'ESTERÒPSIA PER EDATS I GLOBAL EN FUNCIÓ DE LA DISTÀNCIA - MÈTODE 1



VALORS DEL LLINDAR D'ESTERÒPSIA PER EDATS I GLOBAL EN FUNCIÓ DE LA DISTÀNCIA - MÈTODE 2



DE L'AJUSTAMENT

- $d = 1 \text{ m} \rightarrow \mu = 136,62''$
- $d = 3 \text{ m} \rightarrow \mu = 21,38''$
- Bibliog. (no dist.) $\rightarrow 15'' - 40''$

DELS ESTÍMULS CONSTANTS

- $d = 1 \text{ m} \rightarrow \mu = 60,02''$
- $d = 3 \text{ m} \rightarrow \mu = 8,2''$
- Bibliog. (no dist.) $\rightarrow 15'' - 40''$

VISIÓ ESTEREOSCÒPICA (II)


DISTÀNCIA: 15,5 cm

LA TOTALITAT DE LA POBLACIÓ HA VIST L'EFFECTE RELLEU

DISTÀNCIA ENTRE IMATGES (DITS): 24,28 cm



RELACIÓ ENTRE "DI" I "DF" PER INTERVALS D'EDAT



[10-15] - [16-20] - [21-30] - [31-50] - [51-65] - >65

DISTÀNCIA INTERPUPIL·LAR MITJANA: 6 cm

Figs. 11 - 12. Resultats poblacionals referents al tercer estudi, la visió estereoscòpica.