

Benvolguts pares, mares i tutors,

Com cada any i coincidint amb el curs escolar, el Departament de Salut administrerà, a través dels equips d'atenció primària, les vacunes als alumnes als centres escolars segons el calendari de vacunacions vigent a Catalunya.

La vacunació és la millor opció per a la prevenció i el control de les malalties incloses en el calendari de vacunacions, i la millor alternativa tant per a la salut individual com per a la salut de la comunitat, a més de ser un dret de la ciutadania.

Les vacunes que cal administrar durant el curs escolar són les següents:

- **Vacuna contra el virus del papil·loma humà (vacuna VPH)**, en dues dosis, a nens i nenes.
- **Vacuna contra l'hepatitis A (vacuna HA)**, en dues dosis. En el cas que el vostre fill o filla estigui vacunat/da amb una dosi anterior (als 6 anys), se li administrerà únicament la segona dosi per finalitzar la pauta.
- **Vacuna contra la varicel·la (vacuna V)**, que s'administra en dues dosis als nens i nenes que no hagin passat la malaltia ni hagin rebut la vacuna. En el cas que el vostre fill o filla estigui vacunat/da amb una dosi, se li administrerà la segona dosi.
- **Vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (vacuna MACWY)**, en una única dosi als nens i nenes, si no l'han rebut després dels 10 anys, i independentment de les dosis administrades de la vacuna contra el meningococ C conjugada (vacuna MC).

Com a novetat per a aquest proper curs, s'inclourà la vacunació contra el virus del papil·loma humà (vacuna VPH) també als nens (fins ara únicament s'administrava a les nenes). Amb aquesta mesura, es garanteix l'accés a la vacuna de manera equitativa per a la prevenció de la malaltia associada a la infecció per VPH.

Respecte a la infecció per VPH, s'estima que la probabilitat d'infectar-se al llarg de la vida a partir dels 15 anys és del 84,6% en dones i del 91,3% en els homes. Per aquest motiu, és important vacunar abans d'aquesta edat. Tot i això, el 90% d'aquestes infeccions són transitòries i es resolen durant els dos anys posteriors a la infecció.

La vacunació en nens té un impacte directe de protecció contra la infecció produïda per VPH i evitar així càncers a la zona genital i en altres localitzacions. Addicionalment, la vacunació en nens té un potencial impacte indirecte al disminuir la possible transmissió de la infecció.

En nenes, la vacunació és la manera més eficaç de prevenir la majoria de les infeccions causades per alguns tipus de VPH i forma part de les estratègies de prevenció del càncer de cèrvix, tot i que no pot substituir la prevenció secundària, ja que hi ha una petita proporció de càncers de cèrvix causats per virus del papil·loma no inclosos a la vacuna (un 12% aproximadament). És molt important que tant les noies vacunades com les no vacunades facin les revisions periòdiques en arribar a l'edat recomanada.

També cal recordar la importància d'utilitzar sempre el preservatiu per evitar qualsevol tipus d'infecció de transmissió sexual.

L'objectiu de la vacunació al centre escolar és facilitar-ne l'accés i continuar amb el calendari de vacunacions que s'inicia a la infància. Aconseguir que el màxim nombre de persones es vacunin ajuda a controlar la transmissió de les malalties i a protegir les persones més vulnerables. Per aquest motiu, és molt important la vostra col·laboració.

S'establiran les mesures de seguretat i higiene que corresponguin, en funció de la situació epidemiològica del moment, per tal de poder desenvolupar amb normalitat la vacunació als centres escolars.

Amb relació a la vacunació dels alumnes que han tingut la infecció per COVID-19, cal tenir en compte que no es coneixen contraindicacions mèdiques per vacunar persones que han superat aquesta infecció. No s'ha establert cap interval de temps entre la infecció per SARS-CoV-2 i l'administració de vacunes (a excepció de les vacunes contra la COVID-19). Tanmateix, es recomana posposar la vacunació fins que s'hagi resolt el quadre clínic.

En general, totes aquestes vacunes es toleren bé, malgrat que poden causar molèsties locals (inflamació i envermelliment en el lloc de la punció) o malestar general (febres, desmaigs o mal de cap). Pràcticament mai no produeixen efectes adversos greus.

Cal recordar que després de l'administració de vacunes es pot fer activitat normal, tot i que s'aconsella evitar la pràctica d'exercici físic intens durant les quatre hores posteriors.

Us demanem que empleneu el formulari adjunt amb la indicació de si autoritzeu la vacunació del vostre fill o filla, i que el lliureu al tutor o tutora de la classe, ja que **necessitem la vostra autorització per poder administrar les vacunes al centre educatiu.**

Properament us informarem del dia de la vacunació. És **imprescindible que aquest dia el vostre fill o filla porti el carnet de salut o el carnet de vacunacions** per anotar-hi les dosis administrades, revisar la informació que hi consta i poder, si cal, administrar-li les vacunes necessàries.

En cas de detectar que al vostre fill o filla li manca alguna vacuna se us farà arribar un imprès per tal que pugueu adreçar-vos al centre de vacunació per actualitzar el seu estat vacunal.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de vacunes al Canal Salut del Departament de Salut (<https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacunacions/>) o trucar al telèfon 061 Salut Respon.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Cordialment,

Equip de Salut Escolar (ESE) i Equip d'Atenció Primària (EAP)

Setembre de 2022

De moment no ens han comunicat el calendari de vacunació. Així que ens el facin arribar us el comunicarem.