

# CRITERIS DE NO ASSISTÈNCIA A L'ESCOLA PER MALALTIA



## Criteris Generals



Quan és necessari quedar-se a casa?










Fins i tot sense un diagnòstic tancat, l'infant no hauria d'assistir si:

- La malaltia li impedeix seguir les activitats;
- requereix més atenció de la que el centre pot donar;
- o presenta febre, dificultat per respirar, letargia o plors constants.



## La Regla de les 24 hores

En totes les malalties que cursin amb febre, l'infant ha de romandre 24 hores sense febre (i sense antitèrmics) abans de tornar a l'escola.

 Grup de Malaltia	 Malaltia Específica	 Període de No Assistència	 Mesures Addicionals
 Respiratòries	Grip / Infecció Aguda	24h sense febre i tolerància a l'activitat	-
	Faringitis (estreptococ)	Fins a 24h després d'iniciar el tractament	-
	Tos ferina	5 dies des de l'inici del tractament o 21 dies des de l'inici dels símptomes	Malaltia prevenible amb vacuna.
	Tuberculosi	Fins que el metge ho determini (mínim 2-3 setmanes)	Cal avisar Vigilància Epidemiològica.
 Ulls	Conjuntivitis purulenta	Fins a 24h després d'iniciar el tractament	Si hi ha secrecions grogues i dolor.
 Digestives	Diarrees (totes)	48h des de la darrera deposició diarreica	Rentat de mans rigorós.
 Erupcions	Varicel·la	6 dies des de l'erupció o quan les lesions siguin crostes	Atenció a embarassades i nens de risc.
	Xarampió	Fins a 4 dies després de l'inici de l'exantema	Risc alt per a nens no vacunats.
	Escarlatina	24h després d'iniciar el tractament antibiòtic	-
	Rubèola	7 dies després de l'inici de l'exantema	Atenció a embarassades.
	Herpes simple / Zòster	No exclusió (simple) / Exclusió si supura i no es cobreix (zòster)	Evitar contacte amb les lesions.
	Impetigen	48h després d'iniciar el tractament	-
 Altres	Meningitis bacteriana	Fins que toleri l'activitat general	Avisar Vigilància Epidemiològica.
	Parotiditis (Calteres)	5 dies després de la inflamació	Prevenible amb vacuna.
	Polls (Pediculosi)	24h des de l'inici del tractament	No excioure si el tractament és correcte.
	Sama	1 dia després de la primera tanda de tractament	Tractament en 2 tandes (1 setm. interval).
	Tinya	Fins a l'inici del tractament	Tractar també animals domèstics.