



D'acord amb el Pla d'actuació elaborat pel Departament d'educació amb la coordinació de Salut pública

Requisits d'accés als centres educatius

1. No tenir elevació de la temperatura **superior a 37,5°C**.
2. Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós.
3. No estar pendent del resultat d'una prova PCR o d'una altra prova de diagnòstic molecular per ser un cas sospitós.
4. No conviure amb un cas de simptomatologia compatible amb covid-19 que requereixi fer quarantena, segons el protocol vigent.
5. No està considerat contacte estret d'un positiu confirmat que requereixi un període de quarantena o aïllament, segons el protocol vigent.
6. En cas que l'alumne presenti una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la conveniència i les implicacions de realitzar l'activitat educativa presencialment al centre educatiu. Es consideren malalties d'especial risc o consideració:
 - Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori.
 - Malalties cardíques greus.
 - Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments immunosupressors).
 - Diabetis mal controlada.
 - Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Llista de comprovació de símptomes compatibles amb la covid-19

Abans de portar el vostre fill, filla o infant o adolescent al centre cal **comprovar l'absència de símptomes** de la següent llista:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Febre o febrícula > 37,5°C | <input type="checkbox"/> Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap |
| <input type="checkbox"/> Tos | <input type="checkbox"/> Dificultat per respirar |
| <input type="checkbox"/> Mal de coll* | <input type="checkbox"/> Mal de panxa, amb vòmits o diarrea |
| <input type="checkbox"/> Refredat nasal* | |
| <input type="checkbox"/> Pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents) | |

**El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s'han de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen a la llista. La variant delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea.*

En cas de detectar la presència important d'un símptoma o diversos símptomes cal que eviteu portar l'alumne/a al centre i que us poseu en contacte amb el centre educatiu per comunicar-ho.

En horari d'atenció del vostre centre d'atenció primària (CAP), poseu-vos en contacte telefònicament amb el vostre equip de pediatria o de capçalera per fer-ne la valoració mèdica pertinent. En cas contrari o presentació de símptomes de gravetat, truqueu al 061.

Caldrà seguir, en tots els casos, les indicacions i mesures de prevenció i protecció que es facilitin des del CAP i/o serveis mèdics.

També és important comprovar l'absència dels símptomes en la resta de persones de la unitat familiar i, en el cas de detectar-ne la presència, cal que eviteu igualment portar l'alumne/a al centre educatiu.