

Activitats **Consolidació**

Física 1r de batxillerat **Estiu** Curs 2026-2027

Departament de Ciències Experimentals

INS Ermengol IV(Bellcaire d'Urgell)

La presentació d'aquesta feina permetrà millorar la nota a 2n de batxillerat. La correcció del dossier presentat es valorarà i es tindrà en compte en la nota del 1r trimestre de 2n de batxillerat a l'assignatura de física. Se sumará fins a 1 punt a la nota del trimestre, sempre que aquest estigui aprovat.

A partir de la informació detallada a continuació, heu de presentar al setembre, la resolució dels diferents problemes plantejats enquadrats en forma de dossier.

L'estructura del dossier ha de ser:

- Portada : "Física"
Nom de l'alumne/a
Modalitat de batxillerat que cursa
Data d'entrega: primer dia de classe
- Resolució de les activitats i problemes

NO CAL COPIAR ELS ENUNCIATS!!!!!!

Imprimiu i poseu els fulls i, a continuació, resoleu les activitats i els problemes corresponents.

Cinemàtica

PROBLEMA 1

Un avió que vola a 2,5 km d'altura i amb una celeritat de 400 km/h transporta un paquet amb ajuda humanitària i el deixa caure en un descampat pròxim al campament que fa 300 m de longitud en la direcció en què vola l'avió. Calcula a quina distància màxima i mínima ha de llançar el paquet perquè caigui en el descampat.

PROBLEMA 2

Un ascensor puja a velocitat constant de 2 m/s. Quan es troba a 10 m sobre el nivell de terra els cables es trenquen. Negligint el fregament,

- Calcula la màxima alçada que assoleix el compartiment de l'ascensor.
- Si els frens de seguretat actuen automàticament quan la velocitat de descens és 4 m/s, troba l'altura de l'ascensor quan comencen a actuar els frens.

PROBLEMA 3

Un miner puja en l'ascensor de la mina amb una acceleració de $0,5 \text{ m/s}^2$. Als 3 segons d'haver començat a pujar cau una eina pel forat de l'ascensor. Calcula quant triga el miner en sentir el soroll del xoc de l'eina amb el terra. La velocitat del so a l'aire és de 340 m/s.

PROBLEMA 4

Un projectil és llançat des de dalt d'un penya-segat de 150 m d'altura amb una velocitat inicial de 400 m/s i amb un angle d'inclinació de 30° . Determina:

- Les components de la velocitat inicial.
- El temps que triga a caure a terra.
- L'abast horitzontal.
- La velocitat en que impacte a terra i l'angle respecte l'horitzontal amb què ho fa.
- L'altura màxima.

PROBLEMA 5

Les aspes d'un molí giren amb velocitat angular constant: Si fan 90 voltes per minut, calcula:

- a) La velocitat angular en rad/s.
- b) La freqüència i el període.
- c) La velocitat lineal d'un punt de les aspes situat a 0,75 m del centre de gir.

PROBLEMA 6

Un jugador llança una pilota formant un angle de 37° amb l'horitzontal i amb una velocitat inicial de 14,5 m/s. Un segon jugador, que és a 25 m de distància d'ell en la direcció del llançament, inicia mig segon més tard una carrera cap a l'altre jugador per agafar la pilota al vol.

- a) Amb quina acceleració ha d'iniciar la seva cursa per agafar la pilota abans que caigui a terra?
- b) Quina és la seva velocitat en aquest moment?

PROBLEMA 7

En uns exercicis de tir amb arc, la fletxa surt disparada amb una velocitat de 50 m/s a una alçada inicial del terra d'1,5 m. Esbrina:

- a) Quin ha de ser l'angle d'inclinació de l'arc perquè la fletxa encerti el centre de la diana, si la diana es troba a 100 m i el cercle també està elevat 1,5 m del terra?
- b) A quina alçada hauria de ser el centre de la diana perquè la fletxa hi impacti, si la persona dispara amb un angle de 14° ?

PROBLEMA 8


Un mòbil que surt del repòs segueix una trajectòria circular de radi 3 m i té una acceleració angular constant de Π rad/s².

1. Quant temps triga en fer una volta completa?
2. Quina és la velocitat angular als 0'5 s? I l'acceleració normal en el mateix instant?
3. Quant val l'acceleració tangencial als 0,5 s?
4. Quin angle formen l'acceleració tangencial i l'acceleració total als 0,5 segons?

Dinàmica del moviment rectilini i circular

PROBLEMA 9

Els tres blocs del dibuix tenen la mateixa massa. Pots calcular l'acceleració del sistema sabent que el coeficient cinètic de fricció és 0,2?



PROBLEMA 10

Un cos de massa 40 kg està sobre un terra horitzontal amb el qual té una fricció no nul·la. Apliquem al cos una força de mòdul 100 N que forma un angle de 37° amb l'horitzontal, i el cos adquireix una acceleració horitzontal d'1 m/s².

- Quant val el mòdul de la força total que actua sobre el cos? I el de la força normal que el terra fa sobre el cos?
- Determineu el coeficient de fricció dinàmic entre el cos i el terra.

PROBLEMA 11

Una massa m , de 1 kg, col·locada sobre una taula sense fregament està unida a una massa M , de 4 kg, penjada mitjançant una corda que passa per un forat practicat a la taula. El cos de massa M està en repòs mentre que el cos de massa m descriu un moviment circular uniforme de radi 0,1 m.

- Calcula la velocitat amb què es mou el cos de massa m .
- Indica quines són les acceleracions tangencial i normal del cos de massa m .

PROBLEMA 12

Una cabina cilíndrica gira respecte el seu eix amb una velocitat de 5 rad/s. En contacte amb la paret interior hi ha un cos que gira solidàriament amb la cabina. El coeficient de fregament entre la paret i el cos és 0,2. Quin és el radi de la cabina?

PROBLEMA 13

Un cotxe de 2000 kg de massa, arrossega un remolc de 150 kg mitjançant un cable de massa negligible, es troba inicialment en repòs. El cotxe arrenca amb una acceleració que es manté constant durant els primers 10 segons i la tensió del cable durant aquest temps val 500 N. Suposant que la fricció dels pneumàtics del cotxe i del remolc amb el terra equival a una força de fregament amb coeficient 0,2 i que la fricció amb l'aire és negligible, calculeu:

- a) L'acceleració i la velocitat del sistema 8 segons després d'haver-se iniciat el moviment.
- b) La força de tracció i la potència del motor del cotxe 8 segons després d'haver-se iniciat el moviment.

PROBLEMA 14

Un cos de 2 kg està lligat a l'extrem d'una corda de 100 cm de longitud. Gira verticalment, amb velocitat angular constant, i descriu una trajectòria circular. Quan passa pel punt més baix la tensió de la corda és de 100 N. Calcula:

- a) La velocitat lineal del cos en el seu moviment circular? És constant el vector de velocitat lineal? Raona la resposta.
- b) La tensió de la corda en el punt més alt de la trajectòria.

PROBLEMA 15

En un tram del recorregut, l'AVE Lleida-Tarragona du una velocitat constant en mòdul de 300 km/h. En aquest tram fa un revolt de 600 m de radi que està peraltat un angle de 20° . Damunt d'una taula del vagó restaurant hi ha un plat buit de massa 350 g. El plat es troba en repòs en el tren gràcies a la fricció amb la taula, que impedeix que el plat es desplaci cap enfora.

- a) Feu un diagrama de les forces que actuen sobre el plat.
- b) Determineu el mòdul de la força de fricció que actua sobre el plat.
- c) Determineu el mòdul de la força centrípeta que actua sobre el plat.

PROBLEMA 16

Un vehicle de 1000 kg pren una corba a 72 km/h, amb MCU, si el coeficient de fregament és de 0,5. Calcula:

- a) el radi mínim per que no rellisqui en el cas del terra horitzontal.
- b) quin ha de ser el peralt de la carretera, si considerem nul el fregament?

PROBLEMA 17

En unes muntanyes russes, els passatgers recorren una pista circular vertical amb una rapidesa constant de 12 m/s. La distància dels passatgers al centre de la pista és de 8,5 m

- a) Quina força fa el seient de la vagoneta sobre un passatger de 60 kg en el punt més alt de la trajectòria? I en el punt més baix?
- b) Quina serà la rapidesa mínima que haurà de portar la vagoneta en el punt més alt perquè no caiguin els passatgers?

PROBLEMA 18

Un cos de 2 kg de massa es troba subjecte a l'extrem d'una corda de $l = 100$ cm, que gira en el pla vertical descrivint una circumferència en l'aire, si en el punt més baix la tensió de la corda val 100 N, i en aquest moment es trenca la corda: amb quina velocitat surt el cos? Raona quina serà la trajectòria del cos fins arribar al terra.

Si suposem que el cos es movia amb MCU, quina seria la tensió de la corda en el punt més alt?

PROBLEMA 19

Si una atracció de parc del tipus "cadires voladores" consta d'una anella horitzontal de 3 m de radi, del qual pengen cordes de 4 m de longitud, i en l'extrem de la corda s'asseu un home de 80 kg, amb quina velocitat angular ha de girar l'atracció per tal que la corda faci un angle de 37° amb la vertical? Pensa que has de calcular primer el radi de la nova circumferència que descriu l'home en moviment. Quantes voltes fa l'home en 1 minut?

Gravitació Universal i Xocs

PROBLEMA 20

Un jugador de cúrling que fa 70 kg de massa avança a 5m/s sobre la pista gelada amb un disc de granit de 18 kg. Després de llançar el disc, el jugador continua avançant però a menys velocitat, a 3m/s. Calcula la velocitat de llançament del disc.

PROBLEMA 21

Calcula la massa de dos cossos iguals si la força d'atracció entre ells és igual a $2,5 \cdot 10^{-9}$ N, quan estan separats una distància de 2 m.

PROBLEMA 22

Troba la massa d'un planeta sabent que un cos de 70 kg és atret amb una força de 315 N quan és a una distància de 5000 km del seu centre.

PROBLEMA 23

Calcula el mòdul del camp gravitatori creat per un asteroide de $5 \cdot 10^{15}$ kg de massa en un punt situat a 500 km del seu centre. Determina la força que actua sobre un cos de 3000 kg de massa situat en aquest punt.

Quina massa hauria de tenir l'asteroide perquè el camp gravitatori (g) en aquest punt fos d'1 N/kg?

PROBLEMA 24

Un petard faller es col·loca encès a terra i se n'espera l'explosió mentre es procedeix a enregistrar aquesta explosió amb una càmera superlenta. En l'enregistrament es pot observar com el petard es trenca en dos trossos. El primer tros, de 8 g, surt disparat cap a la dreta a 12 km/h. Calcula la velocitat amb què surt disparat el segon tros, de 3 g de massa.

PROBLEMA 25

Jugant al billar, copegem la bola blanca amb el tac. L'impacte dura 0,32 s i la bola, de 23 g de massa, es mou a 0,96 m/s. Amb quina força l'hem colpejat?

Treball i energia

PROBLEMA 26

Una locomotora pot accelerar un vagó a 1 m/s^2 durant 10 s. La massa de la locomotora és de 20 t i la del vagó que arrossega és de 15 t. Calcula el treball total sobre el tren i el treball que fan el motor i la tensió.

PROBLEMA 27

Una molla, de constant recuperadora 400 N/m, es troba comprimida en una taula horitzontal per una massa de 4 kg una distància de 0,1 m. La massa és disparada horitzontalment pel damunt de la taula sense fricció.

- Determina la velocitat amb què surt la massa.
- Si la taula té una altura de 0,9 m, a quina distància del peu de la taula anirà a parar?
- Quin és l'angle d'impacte a terra?

PROBLEMA 28

Una molla dispara una massa de 0,2 kg per una pista horitzontal de 3 m amb un coeficient de fricció 0,2. La compressió de la molla és de 20 cm i la seva constant és de 1000 N/m. Després del pla horitzontal es troba una pista circular sense fricció de radi 1 m. Determineu:

- la velocitat al final del pla horitzontal.
- la velocitat a la part més alta del looping.
- la força que fa la massa sobre la pista en el punt més alt.

PROBLEMA 29

Des de la part superior d'un pla inclinat de 30° situat a una altura de 2 m es deixa anar amb una velocitat de 5 m/s un cos d'1 kg de massa. El cos llisca sense fregament pel pla i quan arriba al pla horitzontal apareix una fricció de coeficient 0,2. Tres metres més enllà hi ha una molla de 100 N/m de constant recuperadora. Quina velocitat tindrà el cos quan topi contra la molla? Quina compressió tindrà la molla?

PROBLEMA 30


Un projectil de 10 g es dispara horitzontalment contra un bloc de fusta de 4 kg que està en repòs sobre una taula horitzontal amb un coeficient de fregament de 0,25. La bala queda encastada en la fusta i el conjunt recorre 1,84 m fins a parar-se. Calculeu la velocitat del projectil en el moment de xocar amb la fusta.

PROBLEMA 31

Considera el sistema de la figura. La massa $m_1=1,5$ kg es troba inicialment en repòs, en contacte amb l'extrem d'una molla ideal de constant recuperadora $K=500$ N/m, comprimida 30 cm. La massa $m_2=1,5$ kg també es troba inicialment en repòs, a una distància de 2 metres de m_1 , a la part interior d'una pista semicircular de radi 0,25 m. Al tram horitzontal que separa m_1 de m_2 , el coeficient de fregament és de 0,2, mentre que a la pista semicircular el fregament és negligible.

Quan la molla es deixa anar, es descomprimeix i impulsa la massa m_1 , que se separa de la molla i xoca elàsticament amb m_2 . Calcula:

- La velocitat de m_1 un instant abans d'entrar en contacte amb m_2 .
- Les velocitats de les dues masses un instant després d'entrar en contacte.
- L'acceleració centrípeta (normal) de m_2 quan arriba a la part més alta de la pista circular.



PROBLEMA 32

Una massa de 500 g penja d'un fil de longitud 2 m. Es deixa anar la massa quan el fil forma un angle α amb la vertical i, quan passa pel punt més baix sense recolzar-se a terra, la seva velocitat és de 3 m/s. En aquest instant es trenca la corda i la massa continua movent-se en un pla horitzontal sense fregament fins a xocar amb una molla. La compressió màxima de la molla a causa del xoc amb la massa és de 40 cm. Calcula:

- a) La tensió de la corda just abans de trencar-se.
- b) El valor de l'angle α .
- c) La constant recuperadora de la molla.