

COM ACTUAR DURANT CRISIS d' EPILEPSIA

RECONÉIXER LA CRISI COM ACTIVA:

ALTERACIÓ DEL NIVELL DE CONSCIÈNCIA

RIGIDESA (augment del to muscular generalitzat, de mig cos o de la cara)

AMB/SENSE SAGSEJADES (tòniques, clòniques o mioclòniques)

OPERTURA OCULAR AMB/SENSE DILATACIÓ PUPIL·LA : MIDRIASIS



PROTEGIR

- Controlar zona i allunyar d'observadors.
- Enretirar possibles objectes.
- No intentar obrir boca, ni introduir cap objecte, ni oferir res.



ACOMPANYAR

- Estar el seu costat en tot moment
- Quan es recupera després d'una crisi sol haver: confusió , mal de cap, cansament , son.
- Afavorir el seu descans



CALMA

- Mantenir la calma, un cop iniciada la crisi no la podrem detenir.
- Evitar que es golpegi o faci mal al caure.
- Posarem la persona posició segura per tal de protegir-la: posar alguna cosa el cap, afluixar roba perquè pugui respirar,



MONITORITZAR

- Mesurar el temps que dura la crisi
- Observar les característiques de la crisi, per poder informar després.



TRACTAMENT

- NO DUBTAR EN ADMINISTRAR TRACTAMENT INDIVIDUALITZAT

STEDSOLID
(DIAZEPAM RECTAL)



<20 kg 5mg
> 20kg 10mg

BUCCOLAM
(MIDAZOLAM ORAL)



1 a 5 anys 5mg
5 a 10 anys 7,5mg
10 a 18 anys 10mg

> 2-3 minuts ↔ 112



INFORMAR ALS PARES/ALS TUTORs

amorillo@ambitcp.catsalut.net

@SiE_altpenedes



Institut Català de la Salut
Equip d'Atenció Primària
Pediatría Territorial Alt Penedès