



ORIENTACIONS SANITÀRIES

(ACORDS PRESOS SOTA SUPERVISIÓ MÈDICA)

És imprescindible que, al moment de portar un infant a l'escola bressol, tingui un control pediàtric correcte.

Per poder matricular l'infant a l'escola bressol s'ha d'entregar un informe del seu pediatre/a on consti l'estat de salut, desenvolupament i vacunació (cada curs escolar s'ha de renovar).

A la nostra escola bressol és obligatori portar les vacunes que marca el calendari.

L'objectiu d'aquestes orientacions és augmentar la immunitat infantil i protegir els infants contra malalties serioses i de transmissió per als quals hi ha vacunes.

MALALTIES I MEDICACIÓ:

Els infants posseeixen un sistema immunitari encara reduït, que els fa molt susceptibles a infeccions; tots sabem que, en aquestes edats, emmalalteixen més sovint que quan són més grans.

Quan a l'escola bressol hi arriba un infant malalt exposa als altres al perill de contagi. L'escola no té les condicions adequades per

resoldre la situació de malaltia. Per ambdues raons convé que cap malalt no entri a l'escola bressol.

Per tal que això pugui ser una realitat, és necessari que totes les famílies de l'escola tingueu previst, a l'hora de matricular l'infant, una solució per als dies que el vostre infant es posi malalt i no pugui assistir a l'escola bressol (avis, cangurs, veïns...) i se'n puguin fer càrrec.

A la nostra escola per tal de reduir en el possible aquest risc de contagi ens regim estrictament per les normes següents:

- No podrà assistir cap infant a l'escola quan presenti:
 - **FEBRE de més de 37,5. Ni havent administrat un antitèrmic abans de venir a l'escola. Si la febre es dona a l'escola als 37,5 °C es trucarà a casa perquè la família reculli l'infant. Mínim 24 hores sense febre i sense administrar cap antitèrmic.**

MALALTIES RESPIRATÒRIES.

- **Infecció aguda de les vies respiratòries:** Fins que l'infant no hagi deixat de tenir febre (mínim 24 hores) i comenci a tolerar l'activitat en general.
- **Amigdalitis:** Mínim fins 24 hores després que l'infant hagi iniciat el tractament i hagi deixat de tenir febre i pugui començar l'activitat en general.

MALALTIES GASTROINTESTINALS.

- **Diarrees:** Fins que les deposicions no s'hagin normalitzat i en el cas d'haver-hi vòmits mínim fins 24 hores després que l'infant hagi deixat de vomitar.
- **Oxiürosi** (cucs): Fins que l'infant hagi fet el tractament.

NO ES RECOLLIRÀ CAP MOSTRA DE FEMTA NI ORINA

MALALTIES QUE ES CURSEN AMB ERUPCIÓ CUTÀNIA

- **Escarlatina:** Fins 24 hores després que l'infant hagi iniciat el tractament.
- **Boca/ mà/ peus:** Fins 6 dies després que hagi aparegut l'exantema, o quan les lesions s'han assecat i han fet crosta.
- **Bufetada:** Mínim 24 hores després de desaparèixer la febre i les lesions de la cara i/o de la resta del cos afectat.
- **Varicel·la:** Fins a 6 dies després que hagi aparegut l'exantema, o quan les lesions s'han assecat i han fet crosta.
- **Rubèola:** Fins 7 dies després que hagi aparegut l'exantema.

- **Xarampió:** Fins a 4 dies després que hagi aparegut l'exantema.

MALALTIES DE LA PELL.

- **Impetigen contagiós:** Fins a 24 hores després que l'infant hagi iniciat el tractament antibiòtic.
- **Pediculosi** (polls): Poden tornar a l'escola bressol un cop realitzat el tractament i extrets els polls i llèmenes. **Cal revisar el cap dels infants durant uns quants dies després de fer el tractament i treure totes les llèmenes restants.**
- **Escabiosi:** Fins que l'infant no hagi acabat la primera tanda del tractament.

ALTRES MALALTIES CAUSADES PER BACTERIS.

- **Conjuntivitis purulenta:** conjuntivitis vermella o rosada amb descàrregues de secrecions blanques o grogues, parpelles enganxades al llevar-se i dolor o vermellor a la zona que envolta l'ull. Fins 24 hores després que l'infant hagi iniciat el tractament.
- **Tos ferina:** Fins a 3 dies després que l'infant hagi iniciat el tractament antibiòtic apropiat.

ALTRES MALALTIES CAUSADES PER VIRUS.

- **Gingivostomatitis**: per herpes simple (aftes a la boca), fins que les lesions no s'hagin assecat, tinguin crosta, es pugui portar una alimentació normal i es toleri l'activitat el general.
- **Mononucleosi infecciosa**: Fins que l'infant no toleri l'activitat en general.
- **Galteres** (parotiditis): Fins a 7 dies després de la inflamació de les glàndules paròtides.
- **Hepatitis A**: Fins a 7 dies després de l'inici dels símptomes, fins que l'infant no comenci a tolerar l'activitat normal.
- Si alguna vegada fos necessari que l'infant, tot i anant a l'escola, precisés medicació haureu de lliurar a l'educadora la recepta o fotocòpia d'aquesta per a qualsevol medicament inclòs els homeopàtics en què el pediatre/a indica la dosi i l'horari, també, caldrà anotar a l'agenda (cada dia), l'hora i la dosi que se li ha de donar. La família ha d'omplir i signar l'autorització perquè l'educadora pugui subministrar el medicament a l'infant.

- Davant la presència prolongada de medicacions o de símptomes no esmentats abans l'escola es reserva el dret d'exigir un informe del pediatre/a de l'infant on consti l'orientació del diagnòstic, la medicació i la garantia del no contagi.
- Si l'infant necessita una dieta especial (per alguna intolerància) caldrà l'informe mèdic.

Si aquesta dieta és per una gastroenteritis sense recepta metge se li farà dieta un màxim de tres dies, després d'aquests dies si ha de continuar la dieta caldrà un paper del metge que indiqui la dieta i la durada.

SIGUEM TOTS RESPONSABLES!!